

# Formación y Evolución del Sistema Solar

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Puntaje: \_\_\_\_\_

---

**1.**

¿Qué describe la teoría de la nebulosa solar?

1. Formación del Sol y los planetas a partir de una nube molecular colapsada
2. Colisión de galaxias que formó el sistema solar
3. Formación de agujeros negros en el centro galáctico
4. Expansión del universo desde el Big Bang

**2.**

El proceso de acreción planetaria se refiere principalmente a:

1. La fusión nuclear en el núcleo estelar
2. La colisión y adhesión de partículas para formar cuerpos mayores
3. La fisión de átomos pesados
4. La emisión de radiación electromagnética

**3.**

Según modelos como el de Niza, ¿qué planeta experimentó una migración significativa durante la evolución temprana del sistema solar?

1. Marte
2. Venus
3. Júpiter
4. Mercurio

#### **4.**

El bombardeo intenso tardío (LHB) ocurrió aproximadamente hace:

1. 4.0 - 3.8 mil millones de años
2. 1 mil millones de años
3. 500 millones de años
4. 100 millones de años

#### **5.**

La teoría más aceptada para la formación de la Luna es:

1. Captura gravitatoria de un cuerpo errante
2. Fisión de la Tierra debido a la rotación rápida
3. Co-formación junto a la Tierra desde la nebulosa
4. Impacto gigante entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte

#### **6.**

La edad del sistema solar se determina principalmente mediante:

1. Datación radiométrica de meteoritos primitivos
2. Observación de la rotación de estrellas
3. Medición de la constante de Hubble
4. Análisis de fósiles en la Tierra

#### **7.**

¿Cuál era el elemento más abundante en la nebulosa solar primitiva?

1. Hierro
2. Oxígeno
3. Hidrógeno
4. Silicio

## **8.**

Un disco protoplanetario se caracteriza por:

1. Ser esférico y estático
2. Girar alrededor de una estrella joven y aplanarse por rotación
3. Carecer de rotación y estar compuesto solo de polvo
4. Existir solo alrededor de estrellas viejas

## **9.**

La diferenciación planetaria resulta en:

1. Una composición homogénea en todo el planeta
2. La separación en capas según la densidad (núcleo, manto, corteza)
3. Un enfriamiento uniforme de la superficie
4. Un aumento de la gravedad superficial

## **10.**

Los planetas gigantes gaseosos se formaron principalmente:

1. Cerca del Sol, donde el gas era abundante
2. Más allá de la línea de hielo, donde los volátiles podían condensarse
3. En el cinturón de asteroides
4. En la nube de Oort

## **11.**

La presencia del cinturón de asteroides, en lugar de un planeta, se atribuye principalmente a:

1. La falta de material en esa región
2. La gravedad de Júpiter que perturbó la acreción
3. La radiación solar intensa
4. El viento estelar que dispersó el material

## 12.

Según las leyes de Kepler, ¿cuál establece que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales?

1. Primera ley (órbitas elípticas)
2. Segunda ley (ley de las áreas)
3. Tercera ley (relación período-semieje)
4. Ley de gravitación universal

## 13.

¿Cuál de las siguientes es una evidencia geológica directa de impactos de asteroides?

1. Cadenas montañosas plegadas
2. Valles fluviales
3. Cráteres de impacto con bordes elevados y eyecta
4. Volcanes en escudo

## 14.

El viento solar temprano contribuyó a la evolución del sistema solar al:

1. Enfriar rápidamente la nebulosa
2. Dispersar el gas remanente del disco protoplanetario
3. Aumentar la tasa de acreción de planetesimales
4. Formar la mayoría de los cometas

## 15.

Una resonancia orbital fuerte entre Júpiter y los asteroides puede causar:

1. Estabilidad orbital a largo plazo
2. Vaciamiento de órbitas específicas (huecos de Kirkwood)
3. Formación de anillos planetarios
4. Todos los anteriores

**16.**

La energía gravitatoria liberada durante la acreción de un planeta de masa  $M$  y radio  $R$  se aproxima por  $E=GM^2/R$ . Si la masa se duplica y el radio se mantiene constante, la energía:

1. Se duplica
2. Se cuadruplica
3. Se reduce a la mitad
4. No cambia

**17.**

En el Sol, la reacción de fusión nuclear dominante en el núcleo es:

1. Fisión del uranio-235
2. Cadena protón-protón
3. Combustión del carbono
4. Fusión del helio en carbono

**18.**

¿Qué región del sistema solar se considera la fuente principal de cometas de período largo?

1. Cinturón de Kuiper
2. Disco disperso
3. Nube de Oort
4. Cinturón de asteroides

**19.**

Los 'Júpiter calientes' son exoplanetas que sugieren migración porque:

1. Son gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de su estrella
2. Son planetas terrestres en órbitas lejanas
3. Tienen composiciones similares a la Tierra
4. No muestran señales de atmósfera

## 20.

En el futuro, el Sol terminará su vida secuencia principal expandiéndose como:

1. Supernova tipo II
2. Agujero negro
3. Gigante roja
4. Enana blanca directamente